

## 莫德納 COVID-19 疫苗接種前/後注意事項

校園集中接種日期及時間：**111 年 5 月 17 日 14：20 開始**

接種單位：劉伊薰小兒科

接種地點：活動中心

接種者配合事項：1. **5/16(一)** 入睡前應把**健保卡**放入書包，5/17(二)早上請孩子將健保卡交給導師收齊。

2. 接種前一晚要有充足的睡眠至少 8 小時，不熬夜。

3. 接種當日**(5 月 17 日)**，**請勿空腹**，(早餐請務必讓學童吃固體的食物，如麵包、飯糰、吐司夾蛋等)，並多喝水。當日可帶點心到校補充熱量，如小包裝餅乾等。請穿著寬鬆短袖，還有放鬆心情。

4. 接種當日會量體溫並有醫生評估，如果您的孩子近日有身體不舒服或特殊狀況或正在服藥中或發燒或不適合施打者，請務必書寫聯絡簿或打電話告知老師，再轉知健康中心，亦可提醒孩子主動告知醫師，甚至提供目前正服用之藥物給醫師參考，請千萬不要勉強接種。

5. 接種當日若因請假缺席、發燒、醫生評估後告知暫不宜接種或學童因害怕打針無法配合等各項因素，以至於未能如期於校園完成接種者，請家長自行帶至衛生所/合約醫療院所進行接種。

完成接種的學童：1. 接種後，以班級為單位於現場休息 15 分鐘，之後整隊將學生帶回到班上休息 15 分鐘，避免接種者落單以防止學生可能會有過敏或身體不舒服而未能及時發現。

2. 接種疫苗當日及接種後 14 日內應避免安排劇烈活動，要多休息並請多喝水。

3. 接種疫苗後，如有身體不適之症狀，得請 3 日疫苗假(含接種當日)，學校從寬認定個案情形，予以准假，且不納入學生個人出缺席紀錄，亦不因此扣減其學業成績評量。**惟請假在家休息時，家裡務必要有家人長輩照顧，不要讓孩子單獨在家。**

4. 接種後，可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常數天內會消失。

5. 接種疫苗後(28 天內)出現，若發生疑似心肌炎或心包膜炎的症狀(例如：急性和持續性胸痛、胸口壓迫感或不適症狀，心悸(心跳不規則、跳拍或顫動)呼吸急促、暈厥(昏厥)、運動耐受不良(例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯等)，務必立即就醫。並於就醫時告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考，如有上述原因就醫亦請同時告知導師或護理師(06-3507779\*1191)進行通報。

6. 本疫苗不得與其他疫苗同時接種，目前建議與流感疫苗的接種間隔建議至少 7 天，與其他疫苗的接種間隔至少 14 天。

7. 聯絡簿上會發下「莫德納 COVID-19 疫苗 6-17 歲接種後注意事項暨接種通知單」，請家長務必詳閱。

未完成接種學童：1. 如要補接種者，請家長先到台南疫苗預約平台預約，並持「莫德納 COVID-19 疫苗 6-17 歲接種後注意事項暨接種通知單」，自行帶至衛生所/合約醫療院所進行接種。

2. 完成接種後，請將「莫德納 COVID-19 疫苗 6-17 歲接種後注意事項暨接種通知單」交回健康中心。

**Ps:健保卡當天會發還孩子，卡片上會貼上接種日期請勿撕下。**